

Aandachtspunten bij antibiotica toediening

Amoxicilline (Clamoxyl®)



- ✓ Maximale spreiding over 24u (bv. 7u-15u-23u)

Nitrofurantoïne (Furadantine®)



- ✓ Bij voorkeur tijdens de maaltijd

Rifampicine (Rifadine®)



- ✓ Nuchtere inname (30min. vóór of 2u na voeding)

Amoxicilline- clavulaanzuur



- ✓ Maximale spreiding over 24u (bv. 7u-15u-23u)
- ✓ Bij voorkeur bij voeding

Fosfomycine (Monuril®)



- ✓ Nuchtere inname (2-3u vóór of na voeding)
- ✓ Bij voorkeur vóór het slapengaan
- ✓ Na het ledigen van de blaas

Metronidazole (Flagyl®)



- ✓ Bij voorkeur tijdens de maaltijd
- ✓ Geen alcohol tijdens de behandeling

Ciprofloxacin / Levofloxacin



- ✓ Niet samen met polyvalente kationen (calcium, ijzer, magnesium,...): spreiding van 2u met medicatie die deze bevatten en met melk/zuivelproducten

Minocycline / Doxycycline



- ✓ Niet samen met polyvalente kationen (calcium, ijzer, magnesium,...): spreiding van 2u met medicatie die deze bevatten
- ✓ Inname met groot glas water
- ✓ 30 min. rechtop zitten na inname

Flucloxacilline (Staphycid®)



- ✓ Nuchtere inname (1u vóór of 2u na voeding)
- ✓ Inname met groot glas water
- ✓ 30 min. rechtop zitten na inname
- ✓ Maximale spreiding over 24u