

# Utilisation correcte des antibiotiques

## Amoxicilline (Clamoxyl®)



- ✓ Répartition maximale sur 24h (ex. 7h - 15h - 23h)

## Nitrofurantoïne (Furadantine®)



- ✓ Pendant le repas

## Rifampicine (Rifadine®)



- ✓ À jeun (30 min avant ou 2h après un repas)

## Amoxicilline- clavulaanzuur



- ✓ Répartition maximale sur 24h (ex. 7h - 15h - 23h)
- ✓ Pendant le repas

## Fosfomycine (Monuril®)



- ✓ À jeun (2 -3h avant ou après un repas)
- ✓ Avant le coucher
- ✓ Après avoir vidé la vessie

## Metronidazole (Flagyl®)



- ✓ Pendant le repas
- ✓ Pas d'alcool pendant le traitement

## Ciprofloxacine / Levofloxacine



- ✓ Ne pas prendre avec des cations polyvalents (calcium, fer, magnésium, etc.): Espacer de 2h avec les médicaments contenant ces éléments ou avec produits laitiers

## Minocycline / Doxycycline



- ✓ Ne pas prendre avec des cations polyvalents (calcium, fer, magnésium, etc.): Espacer de 2h avec les médicaments concernés
- ✓ Prendre avec un grand verre d'eau
- ✓ Rester assis(e) 30 min après la prise

## Flucloxacilline (Staphycid®)



- ✓ À jeun (1h avant ou 2h après un repas)
- ✓ Prendre avec un grand verre d'eau
- ✓ Rester assis(e) 30 min après la prise
- ✓ Répartition maximale sur 24h